

SW 982 [SW-982, SW982]细胞说明书

Cat NO.: CL-0450

1. 售前须知：

1. 该细胞推荐使用Leibovitz'sL-15培养基进行培养，Leibovitz'sL-15不可以通入二氧化碳，会产生细胞毒性；2. 如您没有无二氧化碳的培养箱，可使用DMEM替代Leibovitz'sL-15，使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳；3. 配套专用培养基默认Leibovitz'sL-15配置，如需DMEM配方，请联系销售下单备注更改。

2. 基本信息：

中文名称	人滑膜肉瘤细胞
细胞简称	SW 982 [SW-982, SW982]
细胞别称	SW-982; SW 982
细胞形态	混合形
生长特性	贴壁细胞
培养方案A(默认)	生长培养基：Leibovitz's L-15(PM151010) + 10% FBS(164210-50) + 1% P/S(PB180120) 培养条件：气相：空气，100%；温度：37
培养方案B(可选)	生长培养基：DMEM(PM150210) + 10% FBS(164210-50) + 1% P/S(PB180120) 培养条件：气相：空气，95%；CO ₂ ，5%；温度：37
冻存条件	55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 液氮
传代步骤	1. 吸出原培养液； 2. 加入2mL左右PBS，轻轻晃动培养瓶润洗细胞,吸出PBS丢弃； 3. 加入1mL左右0.25%胰蛋白酶溶液（含EDTA），轻轻晃动培养瓶使之浸润所有细胞； 4. 放入培养箱消化，显微镜下看到细胞块中间的细胞明显变圆有间隙时可终止，全程不要拍打培养瓶； 5. 加入3mL含血清的培养基终止消化，吹打细胞使之脱壁并在液



体里反复吹打使细胞尽量呈单颗粒细胞的悬浮液；

6. 收集细胞悬液离心，1200rpm/min 3分钟，离心完吸出上清丢弃；

7. 加入新鲜培养基，吹打几下混匀细胞即可，按比例接种到新培养瓶，补足培养基，拧松瓶盖或使用透气瓶盖进行培养。

消化时间 2-3min

传代比例（密度） 1:3-1:4

换液频次 2-3次/周

3. 参考资料(来源文献)：

细胞背景描述 SW 982 [SW-982, SW982]是由A·Leibovitz在1974年从一位25岁白人女性的纤维肉瘤手术切片中建立的细胞株；病理组织学评价认为，建立SW 982 [SW-982, SW982]细胞株的纤维肉瘤是与脂肪肉瘤一致的未分化恶性肿瘤。

供体年龄 女性；25岁

组织来源 组织：滑膜；疾病：滑膜肉瘤

细胞类型 肿瘤细胞

肿瘤类型 肉瘤细胞

生物安全等级 BSL-1

细胞保藏中心 ATCC; HTB-93

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托，进行细胞株的技术服务工作，并收取相应细胞株技术服务费用，细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务，收到产品后处理方式及相应售后条款参见《细胞售后条例》。

收到常温细胞后如何处理？

（细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》）

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。



基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。

3. 静置过夜细胞贴壁细胞培养细胞镜检信息照如贴壁细胞状态贴壁细胞照片 细胞形态连续观察依据)；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们的技术支持交流。

发表[中文论文]请标注：SW 982 [SW- 982, SW982] (CL-0450)由武汉普诺赛生命
科技有限公司提供；

发表[英文论文]请标注：SW 982 [SW- 982, SW982] (CL-0450) were kindly
provided by Wuhan Pricella Biotechnology Co.,Ltd.

